

■殺菌剤：農業用

# ブラシン®フロアブル

成分 フェリムゾン……15.0%  
 フサライド……15.0%  
 物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

登録番号：19165  
 毒性：—  
 消防法：—  
 有効年限：3年(5ℓ包装)  
 5年(500ml包装)

包装：500ml×20 5ℓ×4

## ◆特長

- ブラシンはいもち病防除剤として、予防効果のフサライドと治療効果にすぐれるフェリムゾンの混合剤です。
- いもち病だけでなく、ごま葉枯病や変色米などの穂枯れ性病害にも有効な、水稻の総合殺菌剤です。

## ◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	フェリムゾン を含む農薬の 総使用回数	フサライド を含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 褐条病 変色米(カーブリア菌) 変色米(エピコッカム菌) 変色米(アルタナリア菌) 稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 墨黒穂病	1,000倍	60～150ℓ / 10 a	収穫7日前 まで	2回 以内	散布	2回以内	3回以内
	いもち病	300倍	25ℓ /10 a					

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

## ◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)本剤は長期間貯蔵しておくことと分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態に戻してから所定量を取り出すこと。
- (3)散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布すること。
- (4)褐条病を対象とした採種圃場での散布は、翌年の育苗箱中での本病の発生抑制を目的としているが、効果がやや劣ることがあるので、種子消毒処理を併用することが好ましい。
- (5)本剤はいもち病防除を主体とし、その他の病害との同時防除に使用できるが、多発時の内穎褐変病の防除には効果が劣ることがあるので注意すること。
- (6)本剤を希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用すること。

- (7) たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。
- (8) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (9) 取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

#### ◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

#### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。