

■殺菌剤：農業用

DMI (E B I)

シルバキュア®フロアブル

登録番号：20285

毒性：－

消防法：－

有効年限：3年

成分 テブコナゾール……40.0%

物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

包装：500ml×20 1ℓ×15

◆特長

- 浸透移行性に優れ、今までのDMI剤とは異なった作用点を有します。
- 小麦の主要病害に対して安定した高い効果を示し、更に雑菌などによる麦の穂の変色防止効果も期待できます。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	テブコナゾール を含む農薬の 総使用回数			
小 麦	雪腐小粒菌核病	1,000～ 2,000倍	60～150ℓ ／10a	根雪前	1回	散布 無人ヘリコプター による散布	3回以内 (根雪前は1回 以内、融雪後 は2回以内)			
		500倍	25ℓ／10a							
		16倍	0.8ℓ／10a							
	赤かび病 赤さび病 うどんこ病 黒点病 黒変病	2,000倍	60～150ℓ ／10a	収穫7日前 まで	2回 以内	散布 無人ヘリコプター による散布				
								赤かび病 赤さび病	500倍	25ℓ／10a
								赤かび病 赤さび病 うどんこ病	16倍	0.8ℓ／10a
大 麦	網斑病 うどんこ病 赤かび病 黒点病 黒変病	2,000倍	60～150ℓ ／10a	収穫14日前 まで	2回 以内	散布 無人ヘリコプター による散布	2回以内			
								うどんこ病 赤かび病	16倍	0.8ℓ／10a
	葉腐病	2,000倍	100～120ℓ ／10a			散布				
		褐斑病						2,000～ 3,000倍		
てんさい	褐斑病	2,000～ 3,000倍	100～120ℓ ／10a			散布				

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	テブコナゾール を含む農薬の 総使用回数
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	2,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
ばれいしょ	夏疫病			収穫7日前 まで			
豆 類 (種実、ただし、 だいず、らっか せいを除く)	菌核病						
だ い ず	黒根腐病	200倍	100ℓ／10a	出芽4週間後 以降 但し、 収穫7日前 まで		株元散布	
飼料用えんばく	裸黒穂病	600倍	種子1kg当り 希釈液30ml	は種前	1回	種子吹き付け 処理又は 塗沫処理	1回

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきることを。
- (2)本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ること。
- (3)本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。
 - 1) 散布は散布機種種の散布基準に従って実施すること。
 - 2) 散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用すること。
 - 3) 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- (4)小麦に対して希釈倍数500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用すること。
- (5)散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- (6)周辺農作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意すること。
- (7)適用作物群に属する作物又はその新種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (8)本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (9)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1)誤飲、誤食などのないように注意すること。
誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けること。

- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。

◆**魚毒性**

この登録に係る使用方法では該当がない。