

■除草剤：芝用

ブロードスマッシュ™ SC

登録番号：20315
 毒性：－
 消防法：－
 有効年限：5年

成分 フロラスラム……4.5%
 物理的・化学的性状 類白色水性和性粘稠懸濁液体

包装：250ml×12

◆特長

- 広葉雑草の生育または再生初期（本葉3～5葉期）に茎葉処理することにより高い除草効果を示します。
- 芝に対して影響が少なく、低温期散布でも効果を発揮します。

◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	フロラスラムを含む農業の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生広葉雑草	芝生育期 (雑草生育初期)	20～40ml /10a	150～200ℓ /10a	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
	多年生広葉雑草	秋期～冬期 (雑草生育初期)	40～80ml /10a				
西洋芝 (ブルーグラス)	一年生広葉雑草	芝生育期 (雑草生育初期)	20～40ml /10a				
	多年生広葉雑草	芝生育期 (雑草生育初期)	40～80ml /10a				

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤は懸濁性液体なので、使用に際しては容器を振ること。
- (2)本剤は茎葉処理剤なので使用の際は展着剤を加用し、加圧式散布機を用いて雑草の茎葉部に均一に付着するように散布すること。
- (3)本剤の散布適期は雑草の生育初期（本葉3～5葉期）のため生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失ないように散布すること。
- (4)本剤はイネ科雑草およびヒメクグ、ハマスゲには効果がないので、これら雑草の優占圃場ではそれらに有効な処理剤との組み合わせで使用すること。
- (5)本剤は遅効性で、雑草が完全に枯れるまでに春夏期で2～3週間、秋冬期で4～6週間程度かかるので、誤ってまき直しなどしないよう注意すること。
- (6)降雨が予想される場合は使用を避けること。
- (7)草花、樹木の新葉等には薬害を生じる恐れがあるので、かからないよう注意して散布すること。
- (8)本剤は少量でも強い除草効果を示すので薬剤散布後は散布器具やホース内に薬液が残らないように充分洗浄すること。
- (9)本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

通常の使用方法ではその該当がない。

◆魚毒性

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。

散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。