

■殺虫殺菌剤：家庭園芸用

# サンヨール<sup>®</sup>液剤AL

登録番号：20849  
 毒性：－  
 消防法：第2石油類  
 有効年限：4年

成分 DBEDC……………0.04%  
 物理的・化学的性状 淡青紫色澄明液体

包装：100ml×60 420ml×30 1,000ml×16

## ◆特長

- 使いやすいスプレータイプの家庭園芸用殺菌・殺虫剤です。野菜と花の病気と虫に、幅広くお使いいただけます。
- 手を汚さずそのまま手軽に使用できるスプレータイプです。ベランダ園芸や鉢数の少ない方などはもちろん、広い庭の応急用にもなる、ご家庭の園芸常備薬です。

## ◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDCを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 べと病 コナジラミ類 アブラムシ類、ハダニ類	原液	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
トマト ミニトマト	うどんこ病 葉かび病 灰色かび病 コナジラミ類 アブラムシ類、ハダニ類					
ピーマン	うどんこ病 アブラムシ類					
すいか メロン	うどんこ病 アブラムシ類、ハダニ類					
かぼちゃ	うどんこ病					
いちご	ハダニ類 うどんこ病 アブラムシ類			6回以内		
ばら	アブラムシ類 チュウレンジハバチ 黒星病 ハダニ類 うどんこ病 ナメクジ類	－	8回以内	8回以内	8回以内	
きく	白さび病 アブラムシ類、ハダニ類 うどんこ病 ナメクジ類					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DBEDCを含む農薬の総使用回数
ペチュニア スターチス プリムラ パンジー	うどんこ病 ナメクジ類 ハダニ類 アブラムシ類	原液	開花前まで	8回以内	散布	8回以内
さるすべり	うどんこ病 アブラムシ類 カイガラムシ類 ケムシ類 イラガ類		—			
まさき さざんか	ツノロウムシ ケムシ類 イラガ類					
つつじ類	ツツジゲンバイ ツツジコナジラミ ケムシ類、イラガ類					
樹木類 (つつじ類、まさ き、さるすべり、 さざんかを除く)	ケムシ類 イラガ類					
花き類・ 観葉植物 (きく、ばら、ペチュ ニア、スターチス、 プリムラ、パンジー を除く)	うどんこ病 ハダニ類 アブラムシ類 ナメクジ類					
日本芝	葉枯病（ラージパッチ） さび病					

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)ハウス又は露地栽培で高温時の場合には葉の変色等の薬害を生じるおそれがあるので、その場合は使用をさけること。
- (2)多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布すること。
- (3)スターチス、パンジー、ペチュニア、プリムラに使用する場合、花卉に変色症状等の薬害が生じるので開花中は使用しないこと。
- (4)ナメクジ類に対して使用する場合は、薬液が虫体にかかるように散布すること。
- (5)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### ◆安全使用上の注意

- (1)人に向かって噴射しないこと。
- (2)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

- (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) 散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (7) 本剤を施設内で使用するとき、アルコール濃度が高いため特にアルコールに弱い体質の方は、揮発性ガスにより気分が悪くなったり、酔うおそれがあるので、換気を十分にすること。
- (8) 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

#### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。