

■殺菌剤：農業用

DM I

サンリット®水和剤

登録番号：20980
 毒性：－
 消防法：－
 有効年限：3年

成分 シメコナゾール……20.0%
 物理的・化学的性状 類白色水和性粉末45 μ m以下

包装：250 g × 40

◆特 長

- シメコナゾールは浸透移行性に優れ、予防効果・治療効果を有します。
- スペクトラムが広く、リンゴモニリア病にも有効で、上方移行性にも優れています。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シメコナゾールを含む農薬の総使用回数
りんご	褐斑病 黒星病 赤星病 うどんこ病 モニリア病 斑点落葉病	2,000～ 4,000倍	200～700 ℓ ／10 a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	黒星病 赤星病 うどんこ病						
ネクタリン		2,000～ 4,000倍	100～300 ℓ ／10 a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
もも		2,000～ 4,000倍					
小粒核果類	灰星病	2,000～ 4,000倍	200～400 ℓ ／10 a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
おうとう	幼果菌核病	2,000倍					
いちご	炭疽病 うどんこ病	2,000～ 4,000倍	200～700 ℓ ／10 a	展葉始期～ 展葉期	3回以内	散布	3回以内
	だいず	紫斑病					
しょうが	白星病	1,000倍	200～700 ℓ ／10 a	展葉始期～ 展葉期	3回以内	散布	3回以内
しそ	さび病	5,000倍					
茶	炭疽病 もち病	2,000～ 4,000倍	200～400 ℓ ／10 a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
さくら	幼果菌核病	2,000倍	200～700 ℓ ／10 a	展葉始期～ 展葉期	3回以内	散布	3回以内

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) りんごに使用する場合は、次の事項に注意すること。
 - ① モニリア病に対しては、葉腐れの初発後すぐに散布すること。
 - ② 斑点落葉病に対しては、落花後20日頃までの初期防除剤として使用すること。
- (3) いちごの炭疽病に対して使用する場合は、育苗期から本圃定植時までに散布することが望ましい。
- (4) さくらの幼果菌核病に使用する場合は、品種・栽培条件などによって薬害を生じる恐れがあるので、使用者の責任においてあらかじめ薬害がないことを確かめてから使用すること。
- (5) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (6) 使用量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- (7) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (8) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1) 粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- (3) 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。