

■殺虫剤：農業用

フェニルピラゾール系

キラップ[®]粉剤DL

登録番号：21470

毒性：－

消防法：－

有効年限：4年

成分 エチプロール……0.5%

物理的・化学的性状 類白色粉末45 μ m以下 浮遊性指数20以下

包装：3kg×8

◆特長

- 斑点米で問題となるアカヒゲホソミドリカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。
- 残効性及び耐雨性に優れた薬剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農薬の総使用回数
稲	－	ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ イナゴ類	3～4kg/ 10a	収穫14日前まで	2回 以内	散布	2回以内 (は種時(直播) 又は移植時までの 処理は1回以内)
だ い ず			3kg/10a	収穫7日前まで			
水田作物、 畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチ ソウ等の多年生雑 草が優占している 休耕田	カメムシ類	4kg/10a	－			2回以内

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- (2)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。桑にかかった場合には7日以上経過してから給桑すること。
- (3)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ②関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (4)空袋は圃場などに放置せず適切に処理すること。
- (5)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2)散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする事。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。