

■殺菌剤：農業用

タチガレース[®]M粉剤

成分 ヒドロキシイソキサゾール……4.0%
メタラキシルM……0.25%
物理的・化学的性状 類白色粉末45 μ m以下

登録番号 : 22898
毒 性 : —
消 防 法 : —
有効年限 : 4 年

包装 : 1 kg \times 20

◆特 長

- ムシ苗の発生を長期間予防する作用があります。
- 苗立枯病の防除、ムシ苗防止、根の生育促進など、健苗づくりの総合効果があります。
- メタラキシルの光学活性体を除きました。そのため配合量は半分になりましたが効果はそのままです

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名 使用目的	使用量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ヒドロキシ イソキサゾール を含む農薬の 総使用回数	メタラキシル及び メタラキシルM を含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (ピシウム菌) 苗立枯病 (フザリウム菌) ムシ苗防止 根の生育促進	育苗箱 (30 \times 60 \times 3 cm、 使用土壌約5 ℓ) 1箱当り 6～8 g	は種前	1回	育苗箱土壌に 均一に混和	4回以内 (移植前の土壌混 和は1回以内、移 植前の土壌灌注は 2回以内、本田で は1回以内)	4回以内 (移植前の土壌混 和は1回以内、育苗箱 への灌注は1回以内、 本田では2回以内)
稲 (湛水直播)	根の生育促進に よる苗立の安定	乾粒重量の 3%			過酸化カルシウム 剤に添加して種粉 に粉衣する。	2回以内 (種もみへの処理 は1回以内、本田 では1回以内)	3回以内 (種もみへの処理 は1回以内、本田 では2回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤を稲の苗立枯病に使用する場合、ピシウム菌、フザリウム菌には有効であるがリゾープス菌その他による苗立枯病には効果が劣るので注意すること。
- (2)ムシ苗防止に使用する場合、吸水と蒸散の不均衡によって起こるムシ苗に対して有効であるので、このようなムシ苗の発生する地域で使用すること。
- (3)本剤を稲に使用する場合、使用量が多すぎると初期生育が一時抑制される場合があるので、使用量を誤らないように注意すること。
- (4)本剤を育苗箱土壌に混和する場合はなるべく播種直前に行うこと。
- (5)本剤を稲に使用した場合、草丈の高い品種や、播種量の多い条件では生育後期に苗が伸びすぎることがあるので育苗管理に注意すること。
- (6)過酸化カルシウム剤に添加して使用する場合は十分混合して種粉に湿粉衣すること。又、過酸化カルシウム剤の使用上の注意を厳守すること。

- (7)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2)使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋などを着用すること。
作業後はうがいをするとともに洗眼すること。
- (3)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。