

■殺菌剤：農業用

タチガレエース[®]M液剤

成分 ヒドロキシイソキサゾール……30.0%
 メタラキシルM……2.0%
 物理的・化学的性状 黄色澄明水溶性液体

登録番号：22899
 毒性：－
 消防法：第3石油類
 有効年限：4年

包装：500mℓ×20

◆特長

- ムレ苗の発生を長期間予防する作用があります。
- 苗立枯病の防除、ムレ苗防止、根の生育促進など、健苗づくりの総合効果があります。
- メタラキシルの光学活性体を除きました。そのため配合量は半分になりましたが効果はそのままです。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名 使用目的	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ヒドロキシ イソキサゾール を含む農薬の 総使用回数	メタラキシル及び メタラキシルM を含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯病 (フザリウム菌) 苗立枯病 (ピシウム菌) ムレ苗防止 根の生育促進 移植時の活着促進	500～ 1,000倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	は種時 又は 発芽後	1回	土壌灌注	4回以内 (移植前の土壌 混和は1回以内、 移植前の土壌 灌注は2回以内、 本田では1回 以内)	4回以内 (移植前の土壌 混和は1回以内、 育苗箱への灌注 は1回以内、 本田では2回 以内)
		1,000倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ	は種時				
稲 (湛水直播)	苗腐病 (ピシウム菌)	2.5～ 5倍	乾燥種粉1kg 当り30mℓ	は種前		鉄コーティング 種子に吹き付け 処理	2回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、本田では 1回以内)	3回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、本田では 2回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤を稲の苗立枯病に使用する場合、ピシウム菌、フザリウム菌には有効であるがリゾプス菌その他による苗立枯病には効果が劣るので注意すること。
- (2)ムレ苗防止に使用する場合、吸水と蒸散の不均衡によって起こるムレ苗に対して有効であるので、このようなムレ苗の発生する地域で使用すること。
- (3)苗腐病に使用する場合、乾燥種粉に鉄コーティング処理をした後、は種2日前～は種当日に所定量を噴霧器で均一に付着するよう吹き付けること。吹き付け処理した種粉はビニール袋等で密閉して保管し、速やかに使用すること。
- (4)本剤を使用する場合、使用量が多すぎると初期生育が一時抑制される場合があるので、使用量を誤らないように注意すること。

- (5) 本剤を使用した場合、草丈の高い品種や、は種量の多い条件では生育後期に苗が伸びすぎることがあるので育苗管理に注意すること。
- (6) 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
- (7) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1) 原液は眼に対して強い刺激性があるので、薬液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。