

■殺菌剤：農業用

マテリーナ[®]水和剤

成分 オキシリニック酸……10.0%
 ストレプトマイシン硫酸塩……12.5%
 (ストレプトマイシン……10.0%)
 物理的・化学的性状 類白色水和性粉末 45μm以下

登録番号：23645
 毒性：—
 消防法：—
 有効年限：4年

包装：500g×20

◆特長

- オキシリニック酸とストレプトマイシンの混合剤です。
- 細菌病に対して予防効果と治療効果があります。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数
だいこん	軟腐病	1,000倍	100~300ℓ /10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	5回以内	2回以内
はくさい				収穫14日前まで	3回以内		3回以内	3回以内
たまねぎ				収穫7日前まで	—		5回以内	5回以内
こんにゃく	腐敗病			収穫30日前まで	5回以内		6回以内 (種いもへの吹き付けは1回以内、植付後は5回以内)	6回以内 (種いもへの処理は1回以内)
ばれいしょ	軟腐病			収穫7日前まで	3回以内		5回以内 (種いも浸漬は1回以内)	5回以内 (種いもへの処理は1回以内)
ほおずき	斑点細菌病			—	—		4回以内	4回以内

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきることを。
- (2)ボルドー液及び石灰、タルク、ベントナイトなどの吸着性増量剤を含有する薬剤との混用はさけること。
- (3)はくさいに使用する場合、幼苗期、高温時には薬害(クロロシス)を生じるおそれがあるので注意すること。
- (4)だいこんに使用する場合、高温時には薬害(クロロシス)を生じるおそれがあるので注意すること。
- (5)本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った事例があるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組合わせて輪番で使用すること。

- (6) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (7) 取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (3) 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

◆魚毒性

- (1) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。
- (2) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。