

■殺菌剤：農業用

# オルフィン®フロアブル

登録番号：23919  
 毒性：－  
 消防法：－  
 有効年限：3年

成分 フルオピラム……41.7%  
 物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

包装：1ℓ×12

◆特長

- 豆類の菌核病、灰色かび病に対し高い効果を発揮します。
- たまねぎの灰色かび病（白斑葉枯病）に対し、高い予防効果と治療効果を発揮します。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルオピラムを含む農薬の総使用回数
りんご	うどんこ病	4,000倍	200～700ℓ ／10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	黒星病						
モニリア病							
なし	黒星病						
もも	黒星病						
ネクタリン	黒星病						
小粒核果類	灰星病	2,000倍	100～150ℓ ／10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
おうとう	灰星病						
ぶどう	灰色かび病	2,000倍	100～150ℓ ／10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
豆類 (種実、ただし、 らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病						
たまねぎ	小菌核病 灰色かび病 灰色腐敗病	2,000～ 3,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
はくさい	白斑病						
キャベツ	黒星病						
レタス	菌核病						
リーフレタス	灰色かび病						
いちご	灰色かび病 うどんこ病	2,000～ 3,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
	黒星病						
	菌核病	2,000～ 3,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
	灰色かび病						
	うどんこ病	2,000～ 3,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
	うどんこ病						

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

## ◆注意事項

- (1)使用に際しては容器をよく振ること。
- (2)使用液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。
- (3)調製した薬液は、調製した当日に使い切ること。
- (4)りんごに使用する場合、品種「つがる」は開花期までの散布で果そう葉に褐点を生じるおそれがあるので注意すること。
- (5)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (6)適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (7)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## ◆安全使用上の注意

- (1)誤飲などのないよう注意すること。
- (2)散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

## ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。