

## ■その他：農業用

# ポテカッター消毒液

毒性：－  
消 防 法：－

成分 マレイン酸……20%  
性状 青色液体

包装：20ℓ × 1

| 希釈倍数               | 使用薬液量                        | 使用方法                                      |
|--------------------|------------------------------|---|
| 本剤を水道水で<br>2倍に希釈する | 種いも切断1回あたり<br>3～5mlを切断刀に噴霧する | 十勝農機製ポテトカッティングプランター<br>(切断刀消毒液噴霧装置付)で使用する |

### ◆消毒液の調製と使用方法

- ①薬液タンクにポテカッター消毒液原液と等量の水道水をいれ消毒液とする。  
【薬液タンクが20ℓの場合】ポテカッター10ℓと水道水10ℓをいれる。  
【薬液タンクが40ℓの場合】ポテカッター20ℓと水道水20ℓをいれる。
- ②調製した消毒液の色がポテカッター消毒液原液より薄くなっていることを確認する。

### ◆安全使用上の注意

- 皮膚刺激あり。皮膚に付着した場合は付着した部位を水でよく洗い流すこと。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診断/手当を受けること。  
衣類が汚染された場合は、再使用しないこと。再使用する場合には他と分けて洗濯すること。
- 眼に入ると有害。眼に入った場合は水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師の手当を受けること。
- 飲むと有害。飲み込んだ場合は直ちに医師の手当を受けること。
- 保護手袋、保護衣、保護メガネを着用すること。作業後は顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗うこと。薬剤調製は機械の上で行わないこと。

### ◆注意事項

- 本剤は弱酸性であり、金属に長時間接触すると腐食するため、使用後は金属部を水道水でよく洗うこと。
- 本剤は使い切りとし、廃棄する場合は内容物/容器を都道府県の規則に従って廃棄すること。
- 本品は不燃性であるが、周辺火災時は火災に応じた消火剤を使用すること。
- 残液中和の方法と注意事項については「ポテカッター消毒液残液処理法ちらし」等にて別途確認すること。

### ◆禁止事項

- ケミクロンGと混ぜない。塩素ガスが発生して危険。