

■除草剤：農業用

バサグラン[®]粒剤（ナトリウム塩）

登録番号：16117
 毒性：－
 消防法：－
 有効年限：7年

成分 ベンタゾン……11.0%
 物理的・化学的性状 淡褐色細粒

包装：3kg×8

◆特長

- 体系処理剤として中期に使用することによりホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ等に高い効果を示します。
- 本剤は土壤兼茎葉処理剤ですので、散布適期の幅が広い除草剤です。
- 雑草生育期での散布で高い効果があるので、雑草の生育を見てから散布できます。

◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ エゾノサヤヌカグサ シズイ	移植後15～55日 但し、 収穫60日前まで	3～4kg/10a	1回	落水散布 又は ごく浅く 灌水して 散布	2回以内
直播水稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	稲3葉期～ 入水50日後 但し 収穫60日前まで	3kg/10a			

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
 - ①使用にあたっては落水状態（足跡に水が残っている状態）にして水の出入りをとめ、まきむらのないように均一に散布すること。
 - ②水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないよう均一に散布すること。

- Ⅰ) 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしないこと。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水しないこと。
 - Ⅱ) 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用すること。
 - Ⅲ) 深水にすると効果が劣るので注意すること。
- (2) イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防除した後、多年生水田雑草及び一年生広葉雑草の防除を目的として使用すること。
 - (3) 砂質土及び漏水のはげしい水田では使用しないこと。（減水深2cm/日以上）
 - (4) 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので必ず適期に散布すること。
ホタルイ、ウリカフ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、オモダカでは発生盛期から発生揃期まで、クログワイでは草丈15cm以下、エゾノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cmが本剤散布の適期である。
 - (5) クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用すること。
 - (6) 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1) 誤食などのないよう注意すること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

- (1) 水産動植物（藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2) 散布後は水管理に注意すること。