

■ 除草剤：農業用

バサグラン[®]液剤 (ナトリウム塩)

登録番号 : 16124
 毒性 : -
 消防法 : -
 有効年限 : 7年

成分 ベンタゾン……40.0%
 物理的・化学的性状 赤色澄明水溶性液体

包装 : 500ml×20 3ℓ×6

◆ 特 長

- 雑草の発生程度、生育状況を見ながら散布できる茎葉処理型除草剤です。
- 畑地の広葉雑草（タデ類、ハコベ、シロザ、ナズナ、スカシタゴボウ、ノポログク、スベリヒユ、ヤエムグラ等）にも効果があります。

◆ 適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	適用 地帯	ベンタゾン を含む農業の 総使用回数
			薬量	希釈水量				
移 植 水 稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15～55日 但し 収穫50日前まで	500～700ml ／10 a	70～100ℓ ／10 a	2回 以内	落水散布 又は ごく浅く 灌水して 散布	-	2回 以内
	直 播 水 稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ						
た ま ね ぎ (春播移植栽培)	一年生雑草 (イネ科を除く)	移植後6月上旬まで (雑草の3～4葉期) 但し 収穫30日前まで	60～120ml ／10 a		1回	雑草茎葉 散布	全 域	1回

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地域	ベンタソンを含む農薬の総使用回数	
			薬量	希釈水量					
たまねぎ (秋播移植栽培)	一年生雑草 (イネ科を除く)	移植後生葉4葉期まで (雑草の3~4葉期) 但し 収穫30日前まで	60~120mℓ /10 a	70~100 ℓ /10 a	1回	雑草茎葉 散布	全域	1回	
らっきょう		出芽後 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫60日前まで	100~200mℓ /10 a						
いんげんまめ		初生葉展開期~ 本葉抽出始期 (雑草の2~3葉期)	50~70mℓ /10 a						北海道
えんどうまめ		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫70日前まで	100~200mℓ /10 a				全域		
実えんどう さやえんどう		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫40日前まで	100~200mℓ /10 a						
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫50日前まで	100~150mℓ /10 a						
ソルガム		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫30日前まで	100~150mℓ /10 a						
麦類 (小麦を除く)		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫90日前まで	100~200mℓ /10 a						
小麦		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫45日前まで	150mℓ/10 a				2回以内		2回以内
はとむぎ		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫45日前まで	150mℓ/10 a				2回以内		2回以内
べにばないんげん		生育期 (雑草の生育初期 ~6葉期) 但し 収穫45日前まで	100~200mℓ /10 a				1回		畦間雑草 茎葉散布
せり	親株養成期 植付45~60日後まで	200mℓ/10 a	100 ℓ /10 a	雑草茎葉 散布					

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1) イネ科雑草には効果がないので、イネ科雑草の優占圃場での使用はひかえること。
また、イネ科雑草が混在する場合はこれらに有効な除草剤との体系で使用する
こと。
- (2) 散布後、曇天、降雨日が長く続くと効果が劣ることがあるので、晴天時を見はか
らって散布するのが望ましい。
- (3) 高温条件下では、薬害が生じやすいので異常高温下での散布はさけること。
- (4) 重複散布は薬害のおそれがあるのでさけること。また、周辺作物にかからないよ
うに注意すること。
- (5) 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、
特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ま
しい。
- (6) いんげんまめ、せりに使用する場合、本剤は葉枯・褐変症状の薬害を生じやすく、
蒸散の盛んな高温乾燥条件下では薬害により減収することがあるので、雑草害が
予想される場合に限り使用すること。
- (7) たまねぎに使用する場合、直播栽培および苗床のたまねぎには、薬害を生じるお
それがあるので使用しないこと。
- (8) べにばないんげんに使用する場合、薬液が作物に飛散すると葉に褐変症状の薬害
を生じるので、作物に飛散しないように注意すること。
- (9) せりに使用する場合には、落水状態にして水の出入りをとめ、まきむらのないよ
うに均一に散布すること。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水し
ないこと。
- (10) 水稻に使用する場合には一般的注意事項のほか下記についてとくに注意すること。
 - ① 本剤は水の移動に伴う移行性が大きく、一般に水深の浅いほど効果が安定する。
 - イ) 使用にあたっては落水状態にして水の出入りをとめ、まきむらのないよ
うに均一に散布すること。
 - ロ) 水を落とすことができないところでは漏水のない水田に限り、できるだけ
浅水状態（雑草が水面上に出る状態）にしてまきむらのないよう
に均一に散布すること。
 - ハ) 散布後少なくとも3日間（浅水処理は5日間）はそのままの状態を保ち、
入水、落水、かけ流しはしないこと。また、散布後7日間は降雨の有無にか
かわらず落水しないこと。
 - ニ) 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴
天の持続する時を選んで使用すること。
 - ホ) 深水にすると効果が劣るので注意すること。
 - ② イネ科雑草には効果が劣るので、田植前後の土壌処理除草剤で一年生雑草を防
除した後、多年生水田雑草および一年生広葉雑草の防除を目的として使用する
こと。
 - ③ 本剤は生育期に入った雑草に効果があるが、雑草、特に多年生雑草は生育段階
によって効果にふれが出るので必ず適期に散布すること。
ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカでは発生盛期から増殖中期、
オモダカでは発生盛期から増殖初期まで、クログワイでは草丈15～30cm、エゾ
ノサヤヌカグサでは1～4葉期、シズイでは草丈10～30cm、コウキヤガラでは
増殖期、クサネムでは本葉展開期が本剤散布の適期である。
 - ④ クログワイ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用す
ること。
 - ⑤ 軟弱稲では薬害（接触害）のおそれがあるので使用はさけること。
 - ⑥ 高温など薬害を生じやすい条件での使用は多めの希釈水量を用い、低濃度液を
なるべく水稻にかからないように散布すること。

⑦砂質土および漏水のはげしい水田では使用しないこと。(減水深 2 cm/日以上)

◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
使用後は洗眼すること。
- (3) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。