

■殺虫剤：農業用

ネライストキシシン系・ピレスロイド系

エビセクト®トレボン®粉剤DL

成分 エトフェンプロックス……0.3%
チオシクラム……1.0%

物理的・化学的性状 類白色粉末45 μ m以下 浮遊性指数20以下

登録番号 : 16767

毒性 : -

消防法 : -

有効年限 : 3年

包装 : 3kg×8

◆特長

- 接触、食毒作用により優れた効果を示します。
- 速効性、残効性ともに優れダラダラ発生するイネドロオイムシに、特異的な効果を示します。
- エビセクトと合成ピレスロイド剤の混合剤なので、従来の薬剤（有機リン系、カーバメート系）に対し抵抗性の発達した害虫にも安定した効果を示します。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農業の総使用回数	チオシクラムを含む農業の総使用回数
稲	イネドロオイムシ ヒメトビウンカ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ	3kg/ 10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内 (種もみ浸漬は 1回以内、粒剤 は3回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ秤量し、使いきることを。
- (2)本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布すること。
- (3)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (4)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないこと。
 - ②関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (5)本剤を使用した場合には、カルタップまたはベンスルタップを含む農業は使用しないこと。
- (6)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくにはじめて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (7)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1)通常的使用方法では危険性は低いが、誤食などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けさせること。

と。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、安静にして直ちに医師の手当を受けること。

- (2) 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (3) 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

◆魚毒性

- (1) 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
- (2) 水産動植物（甲殻類、ドジョウ、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。養殖池等周辺での使用は避けること。
- (3) 散布後は水管理に注意すること。
- (4) 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。