

■殺虫剤：農業用

IGR（キチン生合成阻害剤）

アタブロン[®]SC

登録番号：18138

毒性：—

消防法：—

有効年限：4年

成分 クロルフルアズロン……10.0%

物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

包装：335mℓ×20

◆特長

- キチン生合成阻害剤で、脱皮阻害作用があります。
- 既存剤の抵抗性害虫にも優れた効果を示します。
- 遅効性ですが低濃度で残効性に優れています。
- 有用昆虫に対する影響はほとんどありません。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフルアズロンを 含む農薬の総使用回数
りんご	ハマキムシ類	3,000～	200～700ℓ/ 10a	収穫7日前 まで	4回 以内	散布	4回以内
	ケムシ類	4,000倍					
	ヨモギエダシャク	4,000～					
	8,000倍						
なし	ハマキムシ類	3,000倍		収穫21日前 まで	3回 以内		3回以内
もも	ハマキムシ類	4,000倍		収穫7日前 まで			
かき	ハマキムシ類			カキノヘタムシガ カキクダアザミウマ	収穫14日前 まで		
	おうとう				ハマキムシ類		収穫7日前 まで
ぶどう	ハスモンヨトウ			発生初期	4回 以内	4回以内	
樹木類	ケムシ類	4,000～ 6,000倍					

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1) 散布液調製時には、使用直前に容器をよく振とうすること。
- (2) 本剤は植物体上での移行性がないため、莖葉部表裏に対し均一に散布すること。
- (3) 本剤は幼虫の脱皮を阻害してやがて死亡させる性質をもつ薬剤で、通常、死亡するまでに7～10日以上を要するので幼虫期になるべく早く散布すること。
- (4) 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬液が飛散し、桑に付着するおそれがある場所では使用しないこと。
- (5) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- (6)適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

◆魚毒性

- (1)水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。