

■殺菌剤：家庭園芸用

ベンゼン・スルホン酸

ネビジン[®]粉剤

成分 フルスルファミド……0.3%

物理的・化学的性状 淡黄色粉末45 μ m以下

登録番号：18210

毒性：—

消防法：—

有効年限：5年

包装：1kg×20

◆特長

- アブラナ科野菜の重大病害である根こぶ病にすぐれた効果を発揮します。
- 長期にわたって効果が持続しますので土壌混和処理を1～3週間前に行っても安定した効果を示します。
- 土壌吸着力が強く、移動性の少ない薬剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルスルファミドを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	菌核病	30kg/10a	定植前	2回以内	全面土壌混和	2回以内	
		20～30kg/10a			作条土壌混和		
		20kg/10a			全面土壌混和		
はくさい ブロッコリー カリフラワー なばな 非結球あぶらな科 葉菜類	根こぶ病	20kg/10a	は種又は定植前	1回	作条土壌混和	1回	
		30kg/10a			全面土壌混和		
					は種前		作条土壌混和
					は種又は定植前		全面土壌混和
なばな類 (なばな、みずかけなを除く)	みずかけな	20kg/10a	は種又は定植前	作条土壌混和	1回		
かぶ				全面土壌混和			
				作条土壌混和			
だいこん	30kg/10a	は種前	全面土壌混和				
ばれいしょ	そうか病	30kg/10a	植付時	1回	作条土壌混和	2回以内	
	そうか病 粉状そうか病	60kg/10a			全面土壌混和		(種いも浸漬は1回以内、土壌混和は1回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤の所定量を作条又は全面に散布し、土壌とよく混和した後、は種、定植又は植付けすること。

- (2)本剤の作条土壌混和を行う際は、本剤の所定量を畦上全面に散布し、土壌中に均一に分布するようによく混和すること。
- (3)つまみ菜・間引き菜には使用しないこと。
- (4)ばれいしょのそうか病に対しては、多発性条件では効果が劣る場合があるので注意すること。
- (5)みずかけなに使用する場合、水掛け開始は薬剤処理後2カ月以降を厳守すること。
- (6)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)誤食などのないように注意すること。
- (2)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3)散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。