

## ■殺菌剤：農業用

オキサゾール系

# タチガレン<sup>®</sup>粉衣剤

成分 ヒドロキシイソキサゾール……70.0%

物理的・化学的性状 淡褐色粉末63 $\mu$ m以下

登録番号：22325

毒性：—

消防法：—

有効年限：3年

包装：1kg×8

### ◆特長

○特にアファノマイセス菌、ピシウム菌による苗立枯病に対して高い防除効果を示します。

### ◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	苗立枯病	種子重量の0.5~1.0%	は種前	1回	種子処理機による種子粉衣	1回
てんさい					種子粉衣	5回以内 (種子粉衣は1回以内、育苗土壌への混和は1回以内、灌注は3回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)本剤はアファノマイセス菌、フザリウム菌、ピシウム菌による苗立枯病に対して有効であるが、リゾクトニア菌には効果が劣る傾向があるので、これらの菌による発病地帯での使用はさけること。
- (2)粉衣した種子は、その日のうちにまくこと。
- (3)湿粉衣したものを直ちには種できない場合は、薬害のおそれがあるのでよく乾燥させること。

### ◆安全使用上の注意

- (1)誤食などのないように注意すること。
- (2)本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3)本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4)使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋などを着用すること。作業後はうがいをするとともに洗眼すること。
- (5)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。