

■殺菌剤：農業用

有機リン系・オキサゾール系

リゾレックス[®]H粉剤

成分 トルクロホスメチル……5.0%
ヒドロキシイソキサゾール……4.0%

物理的・化学的性状 類白色粉末45 μ m以下

登録番号：22600

毒性：—

消防法：—

有効年限：3年

包装：450 g × 40 15kg × 1

◆特長

- リゾクトニア菌、ピシウム菌、アフアノマイセス菌によるてんさいの苗立枯病に、高い効果があります。
- 病原菌糸体に対し強い殺菌作用を発揮します。
- トルクロホスメチルは土壤吸着が強く流亡しにくいいため、土壤混和処理では一般に30～45日間の残効があります。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルクロホスメチルを含む農薬の総使用回数	ヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数
てんさい	苗立枯病	150～250 g ／10 a 分の 用土約280 ㍓	は種前	1 回	ペーパーポット 用の用土又は 覆土に均一に 混和	6 回以内 (育苗土壌への混和は 1 回以内、500倍希釈 灌注は1 回以内、100倍 希釈灌注は1 回以内、 散布は3 回以内)	5 回以内 (種子粉衣は1 回以内、 育苗土壌への混和は 1 回以内、灌注は3 回 以内)
		100～150 g ／10 a 分の 覆土約20 ㍓					
		50～100 g ／10 a 分の 突起板使用 覆土約7 ㍓					

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤を使用する場合は、なるべくは種直前に土壤混和すること。
- (2)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗すること。
- (2)使用の際は農業用マスクなどを着用すること。作業後はうがいをすること。
- (3)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。