

■殺虫剤：農業用

有機リン系

サイアノックス® 乳剤

登録番号：22667
 毒性：－
 消防法：第2石油類
 有効年限：4年

成分 CYAP……50.0%
 物理的・化学的性状 淡黄色可乳化油状液体

包装：500ml×20

◆特長

○速効的で野菜の各種害虫に高い殺虫効果があります。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	CYAPを含む 農薬の総使用回数									
キャベツ	アオムシ ヨトウムシ(若～中齢幼虫) タマナギンウワバ アブラムシ類	1,000～ 1,500倍	100～300ℓ/ 10a	収穫21日前まで	2回 以内	散布	2回以内									
	コナガ キスジノミハムシ成虫	1,000～ 2,000倍														
はくさい だいこん	アオムシ ヨトウムシ(若～中齢幼虫) タマナギンウワバ アブラムシ類	1,000～ 1,500倍		収穫14日前まで				2回 以内	散布	2回以内						
	コナガ キスジノミハムシ成虫	1,000～ 2,000倍														
きゅうり	アブラムシ類 アザミウマ類	1,000倍		収穫開始 3日前まで				2回 以内			散布	2回以内				
なす	テントウムシダマシ	500～ 1,000倍		収穫前日まで												
ねぎ	アザミウマ類			収穫21日前まで												
たまねぎ	アザミウマ類	500～ 1,000倍		収穫14日前まで									3回 以内	散布	3回以内	
いんげんまめ	マメシンクイガ フキノメイガ インゲンテントウ	1,000倍		収穫7日前まで									2回 以内		散布	2回以内
	だいず															
あずき	フキノメイガ			収穫21日前まで									6回 以内			6回以内
ばら	アブラムシ類			－												
きく			－													

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

(1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。

- (2) アルカリ性薬剤との混用はさけること。やむを得ずボルドー液と混用する場合は使用直前に混合すること。
- (3) はくさいに使用する場合、幼苗期及び結球期直前は薬害を生ずるおそれがあるのでさけること。
- (4) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (5) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
 - ③ 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。

◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 原液は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (7) 取扱い及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆魚毒性

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。