

■除草剤：農業用

# ベタダイヤ® S乳剤

成分 デスメディファム……2.3%  
 フェンメディファム……10.0%  
 S-メトラクロール……7.5%  
 物理的・化学的性状 淡黄色澄明可乳化油状液体

登録番号：22820  
 毒性：－  
 消防法：第2石油類  
 有効年限：5年

包装：2ℓ×8 5ℓ×4

## ◆特長

- 3種類の有効成分により、イネ科雑草、広葉雑草、ツククサ等、幅広い草種に効果を示します。
- 混用の手間が省け省力的です（展着剤も不要）。

## ◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	デスメディファムを含む農薬の総使用回数	フェンメディファムを含む農薬の総使用回数	メトラクロール及びS-メトラクロールを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量					
てんさい (移植栽培)	一年生雑草	移植活着後の雑草発生揃期 但し、 収穫90日前まで	500mℓ ／10a	50～ 100ℓ ／10a	1回	雑草茎葉散布 又は 全面散布	2回 以内	3回 以内	2回 以内
てんさい (直播栽培)		てんさい7葉期以降の中耕後 (雑草発生揃期) 但し、 収穫90日前まで							

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

## ◆注意事項

- (1)雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布すること。
- (2)雑草が大きくなると、効果が劣るので、適期散布に努めること。
- (3)砂土では使用しないこと。
- (4)水量が多くなるほど、また薬液調製後の時間が経過するほど結晶を生じ、ノズルをつまらせるため、薬液調製後は速やかに散布すること。
- (5)高温時の散布は薬害を生じる恐れがあるので注意すること。
- (6)てんさい以外の作物には薬害を生じる恐れがあるので、てんさい以外の作物に飛散しないように注意すること。
- (7)水稻に薬害を生じる恐れがあるため、後作物として翌年の水稻の栽培をさけること。
- (8)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- (9) 取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

### ◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 原液は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

### ◆魚毒性

- (1) 水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきることを。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。