

■殺虫剤：農業用

スピノシン系

ディアナ®WDG

登録番号：22909

毒性：－

消防法：－

有効年限：3年

成分 スピネトラム……25.0%

物理的・化学的性状 類白色水和性細粒

包装：100 g × 20

◆特長

- チョウ目害虫、アザミウマ目害虫、ハエ目害虫に対して防除効果を発揮し、幅広い殺虫スペクトラムを示します。
- 各ステージ（卵・幼虫・成虫）に優れた効果を示します。
- 収穫前日までご使用いただけます。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ケムシ類 キリガ類	5,000～ 10,000倍	200～700ℓ / 10a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	2回以内
	ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ	5,000～ 15,000倍					
もも ネクタリン	モモハモグリガ シンクイムシ類 ハマキムシ類 アザミウマ類	5,000～ 10,000倍					
おうとう	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類 アザミウマ類						
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 チュウゴクナシキジラミ アザミウマ類						
すもも	シンクイムシ類	5,000倍					
ぶどう	ハスモンヨトウ アザミウマ類 ハマキムシ類	5,000～ 10,000倍					
	アザミウマ類 ハマキムシ類						
かき	アザミウマ類 ハマキムシ類 カキノヘタムシガ	10,000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハモグリガ アザミウマ類 コナジラミ類 ミカンキジラミ ヨモギエダシヤク ケムシ類 ハマキムシ類 アゲハ類	5,000～ 10,000倍	200～700ℓ / 10 a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	10,000倍					
くり	モモノゴマダラノメイガ	10,000倍					
いちじく	アザミウマ類	5,000倍					
	ショウジョウバエ類	10,000倍					
うめ	ケムシ類	5,000～ 10,000倍					
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ ハマキムシ類						
アロニア	シンクイムシ類	10,000倍					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	5,000～ 10,000倍					
さんしょう (果実)	アザミウマ類						

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせ調節すること。
- 散布液調製後は、そのまま放置せず、できるだけ速やかに散布すること。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。桑葉にかかった場合には使用後約1ヶ月間は蚕に給餌しないこと。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
 - ③関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

- (2) 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆**魚毒性**

この登録に係る使用方法では該当がない。