

■殺菌剤：農業用

銅殺菌剤

ケービーダブル

K B W®

成分 塩基性塩化銅……81.0%

(銅……48.0%)

物理的・化学的性状 淡青緑色水和性粉末45 μ m以下

登録番号：22931

毒性：—

消防法：—

有効年限：5年

包装：1kg×20

◆特長

○塩基性塩化銅製剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	銅を含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病 夏疫病	400~800倍	100~300 ℓ / 10a	—	散布	—
トマト	疫病					
ミニトマト	疫病					
てんさい	褐斑病					
はっか	さび病					
いんげんまめ	かさ枯病	600~800倍				
きゅうり	斑点細菌病	500倍				

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1) 所定量の水に本剤を加え、十分かきまぜてから散布すること。
- (2) 本剤は無機の銅剤であるため、きゅうりに対して薬害を生じやすいので、下記の事項に十分注意すること。
 - ① 幼苗期は特に発生しやすいので、中期以降の散布にすること。
 - ② 高温時の散布は症状が激しくなることがあるのでさけること。
 - ③ 連続散布すると葉の周辺が黄化したり、硬化することがあるので過度の連用をさけること。
 - ④ 炭酸カルシウム剤の所定量の添加は薬害軽減に有効であるが、収穫間際には果実に汚れを生ずるので留意すること。

◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
- (2) 粉末は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬液が眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 散布の際は農業用マスクなどを着用すること。
作業後はうがいをすること。

◆魚毒性

- (1)水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。