

■殺菌剤：農業用

シュードモナス ロデシア

マスタピース®水和剤

登録番号：23259

毒性：－

消防法：－

有効年限：常温1年

冷蔵4年

成分 シュードモナス ロデシア HAI-0804株……5×10⁹CFU/g

物理的・化学的性状 類白色水和性粉末

包装：100g×30 1kg×10

◆特長

- 生きた微生物を有効成分とする細菌病防除剤です。
- バイオフィルム形成能力がある微生物で、病原性細菌の侵入を効果的に防ぎます。
- 改正JAS法に適合しているため使用回数制限がなく、且つ、農薬の使用回数にカウントされません。
- 各種薬剤耐性菌に対しても効果的です。
- 作物に対する汚れは極めて少ない薬剤です。
- 防除効果に対する降雨の影響が少ない薬剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シュードモナス ロデシアを含む 農薬の総使用回数
いも類 野菜類 (だいこん、はくさい、 ブロッコリー、キャベツ、 レタス、非結球レタス、 かぼちゃ、ズッキーニ、 しょうがを除く)	軟腐病	1,000～ 2,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫前日 まで	－	散布	－
だいこん	軟腐病						
はくさい	黒斑細菌病						
キャベツ	軟腐病 黒斑細菌病 黒腐病						
レタス 非結球レタス	軟腐病 腐敗病 斑点細菌病						
ブロッコリー	軟腐病 黒斑細菌病 花蕾腐敗病						
しょうが	腐敗病						
かぼちゃ ズッキーニ	軟腐細菌病						
かんきつ	かいよう病	1,000～ 4,000倍	200～700ℓ ／10a				
小粒核果類		1,000～ 2,000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シュードモナスロデシアを含む農薬の総使用回数
もも ネクタリン	せん孔細菌病	1,000～ 2,000倍	200～700ℓ ／10a	収穫前日 まで	—	散布	—
マンゴー	枝枯細菌病 かいよう病	2,000倍					
キウイフルーツ	かいよう病						

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)本剤の有効成分は生菌であるので、開封後はすべて使いきること。
- (3)予防効果が主体なので、発病前から発病初期に7～10日間隔で散布すること。
- (4)散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ調整すること。
- (5)適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。
なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2)散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3)作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4)かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (5)夏期高温時の使用を避けること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。