

## ■殺菌剤：農業用

ピリオフェノン系

**プロパティ<sup>®</sup>フロアブル**

登録番号：23368

毒性：－

消防法：－

有効年限：3年

成分 ピリオフェノン……26.8%

物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

包装：100ml×20

### ◆特長

- うどんこ病に優れた効果
- 次世代菌密度低下効果（サニーテーション効果）
- マルチスプレッド効果による優れた残効性と耐雨性
- 有用生物や天敵に対して影響が少ないIPM（総合的病害虫管理）に適合した薬剤です。

### ◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリオフェノンを含む農薬の総使用回数
小麦	うどんこ病	3,000～4,000倍	60～150ℓ／10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
りんご			200～700ℓ／10a		2回以内		2回以内
日本なし					3,000倍		3回以内
ぶどう		100～300ℓ／10a	2回以内	2回以内			
きゅうり		3,000～4,000倍			3回以内		3回以内
いちご			3,000倍	2回以内			
すいか		3,000倍			2回以内		2回以内
メロン			3,000倍	2回以内			
なす	3,000倍	2回以内			2回以内		
ピーマン			3,000倍	2回以内		2回以内	
さやえんどう	3,000倍	2回以内			2回以内		
かぼちゃ			3,000倍	2回以内		2回以内	
トマト	3,000倍	2回以内			2回以内		
ミニトマト			3,000倍	2回以内		2回以内	

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)使用直前に容器をよく振ること。
- (2)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (3)出来るだけ発病前又は発病初期に散布すること。
- (4)使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- (5)本剤の使用に当っては、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。