

■ 除草剤：農業用

# ブルーシア<sup>®</sup>フロアブル

登録番号：23859  
 毒性：－  
 消防法：第3石油類  
 有効年限：3年

成分 トルピラレート……10.4%  
 物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

包装：500ml×10

## ◆特長

- 一年生イネ科雑草や一年生広葉雑草をはじめ、イヌホオズキ、シロガ、イチビ等の問題雑草に高い莖葉処理効果を示します。
- 飼料用とうもろこしの多くの品種で影響が少ない除草剤です。
- 効果発現は早く、新葉を白化させ、雑草を枯死させます。

## ◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	トルピラレートを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
飼料用 とうもろこし	一年生雑草	とうもろこし 3～5葉期 但し、 収穫45日前まで	40～50ml ／10a	100ℓ／10a	1回	雑草莖葉散布 又は 全面散布	1回
		とうもろこし 6～7葉期 但し、 収穫45日前まで	50～75ml ／10a	100～150ℓ ／10a			

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

## ◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)使用の直前に、容器をよく振ること。
- (3)本剤は飼料用とうもろこし用除草剤のため、食用とうもろこしには使用しないこと。
- (4)散布後、一時的にクロクシス症状を生じることがあるが、その後の生育、収量には影響しない。
- (5)散布薬液の飛散によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布すること。
- (6)雑草生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので、時期を失しないように散布すること。
- (7)雑草莖葉にかかると、まきおらのないように均一に散布すること。
- (8)散布後6時間以内の降雨は効果を低下させるので、天候に注意すること。
- (9)使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意すること。
- (10)散布器具、容器の洗浄水等は河川に流さず、周囲に影響のない方法で処理を行い、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。

- (11) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (12) 取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

#### ◆安全使用上の注意

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

#### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。