

■殺菌剤：農業用

SDHI

ケンジャ®フロアブル

成分 イソフェタミド水和剤……36.0%
物理的化学的性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

登録番号：23993
毒 性：—
消 防 法：—
有効年限：3年

包装：335mℓ×20 1ℓ×15

◆特 長

- 病原菌生活環の多くのステージに作用します。特に感染前（胞子発芽～付着器形成期）に高い防除効果を発揮します。
- 有効成分が速やかに葉表→葉裏（葉裏→葉表）へ浸透することで、安定した防除効果を発揮します。
- 胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。
- 訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPM（総合的病害虫管理）に適合した薬剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソフェタミドを含む農薬の総使用回数
ぶ ど う	黒とう病 灰色かび病 褐斑病 うどんこ病		200～700ℓ ／10a	収穫7日前まで	3回以内		3回以内
豆 類 (種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	1,500倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
いんげんまめ	菌核病 灰色かび病 炭疽病					散布	
さやえんどう	灰色かび病						
き ゆ う り	菌核病 灰色かび病	1,000～ 1,500倍	100～300ℓ ／10a	収穫前日まで	4回以内		4回以内
	褐斑病 うどんこ病	1,500倍					
た ま ね ぎ	灰色かび病	1,000～ 1,500倍		収穫3日前まで			
レ タ ス 非結球レタス	菌核病 灰色かび病	1,500倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1) 使用直前に、容器をよく振ること。
- (2) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (3) 出来るだけ発病前又は発病初期に散布すること。
- (4) 使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- (5) ぶどうに使用する場合、果粒大豆粒大期から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱および果実に汚れを生じるおそれがあるので、十分に注意すること。
- (6) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (7) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

通常の使用方法ではその該当がない。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。